

Билет 1.

1. Дать определение монотонного оператора $A : B \rightarrow B^*$.
 2. Дать определение пространства $L_p(S, X)$, записать норму, указать тип.
 3. Сформулировать лемму об остром угле для стационарного случая.
 4. Сформулировать условие коэрцитивности для оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$,
 $A : \overset{0}{H^1}(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(\overset{0}{H^1}(\Omega) \right)^*$.
-

Билет 2.

1. Дать определение семинепрерывного оператора $A : B \rightarrow B^*$. Пример семинепрерывного оператора.
2. Дать определение строго монотонного оператора $A : B \rightarrow B^*$. Пример строго монотонного оператора.
3. Метод Галеркина для операторного уравнения $Au = h$, $A : B \rightarrow B^*$, (B – банахово пространство, B^* – пространство, сопряженное к B) с семинепрерывным оператором. Алгоритм построения последовательности галеркинских приближений.
4. Сформулировать условие ограниченности для оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$,
 $A : \overset{0}{H^1}(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(\overset{0}{H^1}(\Omega) \right)^*$.

Билет 3.

1. Дать определение Банахова и Гильбертова пространства. Примеры пространств.
2. Дать определение коэрцитивного оператора $A : B \rightarrow B^*$.
3. Показать, что выражение

$$\|u\|_{L_p(S,X)} = \left(\int_S \|u\|_X^p ds \right)^{\frac{1}{p}}$$

задает норму в пространстве $L_p(S, X)$.

4. Сформулировать условие семинепрерывности для оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$,
 $A : \overset{0}{H}{}^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(\overset{0}{H}{}^1(\Omega) \right)^*$.
-

Билет 4.

1. Дать определение пространств $C^k(\Omega)$, $C^k(\overline{\Omega})$, $\overset{0}{C}{}^k(\overline{\Omega})$, $L_p(\Omega)$, $H_1(\Omega)$, $\overset{0}{H}{}_1(\Omega)$. Какие из них являются банаховыми, гильбертовыми? Выписать (где возможно) норму, скалярное произведение.
 2. Дать определение строго монотонного оператора $A : B \rightarrow B^*$.
 3. Метод Галеркина для операторного уравнения $Au = h$, $A : B \rightarrow B^*$, (B – банахово пространство, B^* – пространство, сопряженное к B) с семинепрерывным оператором. Построение Галеркинской последовательности.
 4. Доказать, что функция $u = xt$, $x \in (a, b)$, $t \in [0, 1]$ измерима и интегрируема по Бохнеру.
-

Билет 5.

1. Дать определение сепарабельного и рефлексивного пространств.
2. Определить понятие множества функций $(S \rightarrow X)$. Определение функции класса $(S \rightarrow X)$ дифференцируемой в точке.
3. Метод Галеркина для операторного уравнения $Au = h$, $A : B \rightarrow B^*$, (B – банахово пространство, B^* – пространство, сопряженное к B) с оператором с полуограниченной вариацией. Построение Галеркинской последовательности.
4. Доказать, что выражение

$$\|u\|_{C^m(S,X)} = \sum_{j=0}^m \sup_{t \in S} \|u^{(j)}(t)\|_X$$

задает норму в пространстве $C^m(S, X)$.

Билет 6.

1. Определить понятие множества функций $(S \rightarrow X)$. Определение функции класса $(S \rightarrow X)$ дифференцируемой на множестве.
 2. Дать определение простой функции из класса $(S \rightarrow X)$. Интеграл Бохнера от простой функции.
 3. Доказать, что функция $u = xt$, $x \in (a, b)$, $t \in [0, 1]$ измерима и интегрируема по Бохнеру.
 4. Привести краевую задачу $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = 0$, где Δ – оператор Лапласа, $\Omega \subset E_n$ – ограниченная область с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$, $f \in L_2(\Omega)$, к операторному уравнению с коэрцитивным, слабо компактным оператором.
-

Билет 7.

1. Дать определение пространства $C(S, X)$, записать норму, указать тип.
 2. Дать определение функции $u \in (S \rightarrow X)$ интегрируемой по Бохнеру на множестве S , на множестве $B \subset S$. Привести пример.
 3. Сформулировать теорему Рисса о представлении.
 4. Сформулировать условие строгой монотонности оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$,
 $A : H^1_0(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(H^1_0(\Omega) \right)^*$.
-

Билет 8.

1. Дать определение коэрцитивности оператора $A(t)(u) : L_p((0, T), X) \rightarrow L_{p'}((0, T), X^*)$.
2. Дать определение существенно ограниченной функции.
3. Доказать, что выражение

$$\|u\|_{C^m(S, X)} = \sum_{j=0}^m \sup_{t \in S} \|u^{(j)}(t)\|_X$$

задает норму в пространстве $C^m(S, X)$.

4. Сформулировать условие полуограниченной вариации для оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$, $A : H^1_0(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(H^1_0(\Omega) \right)^*$.

Билет 9.

1. Дать определение пространства $L_\infty(S, X)$, записать норму, указать тип..
 2. Дать определение семинепрерывности оператора $A(t)(u) : L_p((0, T), X) \rightarrow L_{p'}((0, T), X^*)$.
 3. Сформулировать лемму об остром угле для стационарного случая.
 4. Сформулировать условие коэрцитивности для оператора $A = -\Delta = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$,
 $A : H^1_0(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$. Здесь $H^{-1}(\Omega) = \left(H^1_0(\Omega) \right)^*$.
-

Билет 10.

1. Определить понятие множества функций $(S \rightarrow X)$. Определение функции класса $(S \rightarrow X)$ дифференцируемой в точке.
2. Дать определение семинепрерывного оператора $A : B \rightarrow B^*$.
3. Сформулировать теорему единственности решения операторного уравнения $Au = h$ с коэрцитивным, слабо компактным и строго монотонным оператором.
4. Доказать, что выражение

$$\|u\|_{C^m(S, X)} = \sum_{j=0}^m \sup_{t \in S} \|u^{(j)}(t)\|_X$$

задает норму в пространстве $C^m(S, X)$.

Билет 11.

1. Дать определение оператора $A : B \rightarrow B^*$ с полуограниченной вариацией.
2. Дать определение монотонности оператора $A(t)(u) : L_p((0, T), X) \rightarrow L_{p'}((0, T), X^*)$.
3. Доказать, что функция $u = xt$, $x \in (a, b)$, $t \in [0, 1]$ измерима и интегрируема по Бохнеру.
4. Пусть $g \geq 0$ – финитная в Ω непрерывная функция. Является ли нормой в $L_2(\Omega)$ функция

$$\rho(u) = \int_{\Omega} g(x)u^2(x) dx?$$